



FICHE SYNTHETIQUE SUR LA DYADE AUTISTIQUE DU DSM-5 (2023) et de la CIM-11 (2018)

* DSM : Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ** CIM : classification internationale des maladies

L'AUTISME, le Trouble du Spectre Autistique

Le TSA est un **trouble du neurodéveloppement** : un fort **facteur génétique** (héréditaire ou *de novo*), des facteurs environnementaux (infections lors de la grossesse, exposition à des substances toxiques, carences nutritionnelles, hypoxie Ne sont pas des causes de TSA : les vaccins, la séparation avec la mère, l'influence du microbiote (ce dernier serait une conséquence)

Informations essentielles

Comment diagnostiquer un TSA ?	<u>Deux types de tests validés</u> : l' ADI-R et l' ADOS . L'ADOS-2 a été révisé en 2012 avec l'ajout du module TODDLER pour les enfants âgés de 12 à 30 mois.
Quand les réaliser ?	Depuis le plus jeune âge (12 mois), jusqu'à l'âge adulte.
Où les pratiquer ?	En service hospitalier spécialisés, en libéral par des psychologues spécialisés, par les plateformes PCO Annuaire-Liste-plateformes-PCO-25-04-2025.pdf
La Dyade autistique	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: flex-start;"><div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;"><div style="background-color: #4a7ebb; color: white; padding: 10px; border-radius: 10px; width: 150px; text-align: center;">Déficits de la communication et des interactions sociales</div><div style="margin-left: 10px; background-color: #d9e1f2; padding: 10px; border-radius: 10px;"><ul style="list-style-type: none">•Déficit de réciprocité sociale ou émotionnelle•Déficit des comportements non verbaux•Déficit du développement, maintien de la compréhension des relations</div></div><div style="display: flex; align-items: center;"><div style="background-color: #4a7ebb; color: white; padding: 10px; border-radius: 10px; width: 150px; text-align: center;">Caractère restreint et répétitif des comportements, des intérêts</div><div style="margin-left: 10px; background-color: #d9e1f2; padding: 10px; border-radius: 10px;"><ul style="list-style-type: none">•Mouvements répétitifs ou stéréotypés•Intolérance aux changements, adhésion inflexible à des routines•Intérêts restreints ou fixes, anormaux dans leur intensité ou leur but•Hyper ou hypo sensibilité aux stimuli sensoriels</div></div></div>
Les niveaux de sévérité	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"><div style="background-color: #4a7ebb; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px; text-align: center; width: 150px;">NIVEAU 1 : Nécessite un soutien</div><div style="background-color: #4a7ebb; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px; text-align: center; width: 150px;">NIVEAU 2 : Nécessite un soutien important</div><div style="background-color: #4a7ebb; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px; text-align: center; width: 150px;">NIVEAU 3 : Nécessite un soutien très important</div></div>

Références

Nous vous proposons ici des articles pour aller plus loin dans la découverte du TSA

- [La lettre d'Ulysse](#)
- [La maison de l'autisme](#)
- [Autisme Diffusion - Accompagner Les Troubles Autistiques](#)
- [Le centre de ressources autistiques d'IDF](#)